

Paarbladig goudveil (7-1)



Gewoon plakkaatmos (7-2)



De soorten representeren 2 typen Bronmos, voorkomend in de dalen en geulenstelsels van het beuken-Eikenbos (42) en Eiken-Haagbeukenbos.

N.B.: In kleur = in opnamen 2022, open ring = betreft opnamen van vóór 2022 .

Galigaan (8-1)



Riet (8-2)




De Rietmoerassen (8) worden gekenmerkt door een type met Galigaan (8-1) voorkomend aan de oevers van de plas en zonder Galigaan (8-2)

Gagel (36-1)



Grauwe wilg (36-2)



In de Wilgenstruwelen aan de wateroevers groeit meestal (36-2). Verder van het open water staat meestal een soortenarmer Wilgenstruweel, zonder Gagel (36-2).

Stijve zegge (39-1)



Elzenzegge (39-1)



Het meest karakteristieke Elzenbroek bestaat uit horsten en slenken met als kenmerkende soorten Stijve zegge, Elzen zegge en Pluimzegge (39-1)

Moeraszegge (39-2)




Reuzenpaardenstaart (39-2 / 43-1)



Tussen de lagergelegen Wilgenstruwelen (36) en de hogergelegen Bronbossen bevinden zich eerst zones met Moeraszegge (39-2) en vervolgens zones met Reuzenpaardenstaart (39-3). Reuzenpaardenstaart kan zich ook ontwikkelen als onderdeel van een Goudveil-Essenbos (34-1).

Beide soorten komen tot dominantie, geholpen door een uitgebreid wortelstokken systeem en mogelijk beter opgewassen tegen wisselende grondwaterstanden.

Zwarte els (39)



Zachte berk (40)



De moerasbossen worden gedomineerd door Zwarte els (39) of door Zachte berk (40). Vaak worden tussenvormen en overgangsvormen aangetroffen. Het Elzenbroek karakteriseert vaak meer beweeglijk water, langs bronbeekjes. Zachte berk ontwikkelt zich vaak op meer hydrologisch geïsoleerde plaatsen, gekoppeld met veen ontwikkeling.

Adelaarsvaren (40-2 / 42-2)



Braam (39-2 / 40-1 / 40-2 / 42-1 / 42-2 / 43-2/3)



Adelaarsvaren en Bramen wordt aangetroffen op randen en flanken van Beuken-Eikenbos (42-2), vaak op wat drogere plaatsen. Ook op drogere flanken en randen en verdrogende gedeelten van Berkenbroek komt Adelaarsvaren en Braam tot dominantie in de ondergroei.

P.S. de waarnemingen betreffen beschikbare opnamen en waarnemingen; de soorten kunnen dus een grotere verspreiding hebben dan aangetoond; zeker in het minder toegankelijke zuidelijk deel.